

Nr 133. *Pleurothallis caliensis*



Nr 135. *Pleurothallis citrinae*

geformter Lippe.

Pleurothallis citrina Schltr., nov. spec.

Epiphytica, pusilla, 12—15 cm alta; rhizomate breviter decumbente; radicibus filiformibus, flexuosis, tenuibus, glabris; caulis c. 5 mm distans, erectis, gracilibus, unifoliatis, vaginis 3 arcte et altius amplectentibus infra medium obsessis, 5,5—7 cm longis, c. 1,5 mm diametentibus; folio erecto, oblongo-ligulato, obtuso, basi in petiolum c. 5 mm longum angustato, carnoso, lamina 4,5—5 cm longa, medio fere 8—11 mm lata; inflorescentiis fasciculatis, erecto-patentibus, 1—1,5 cm longis, laxo pauci-floris; bracteis cucullatis, apiculatis, ovario pedicellato duplo fere breviori-

bus; floribus parvulis, tamen in affinitate inter majores, tenuibus, fido collectoris citrinis glabris; sepalis lanceolatis, lineari-attenuatis, obtusiusculis, 5-nerviis, 8 mm longis, lateralibus obliquis; petalis e basi oblonga lineari-attenuatis, obtusiusculis, uninerviis, 5 mm longis; labello basi leviter curvato, oblongo-ligulato, obtuso, carnosulo, 2 mm longo, indiviso, laevi; columna mediocri, dimidio superiore dilatata, clinandrio trilobulato, denticulato, 2 mm alto, pede 1 mm longo; oyarjo pedicellato, glabro, pedicello bene longiore incluso 3 mm longo.

Pleurothallis obovata Kränzl., in Engl. Jahrb. XXVI (1899), p. 442
(nec Ldl.).

Cauca: An Erdwällen um La Cruz und über La Piedra, bei Pasto,
2000—2500 m. — F. C. Lehmann no. 6926.

Die Art gehört allerdings in die Verwandtschaft von *P. obovata* Ldl., steht aber der brasilianischen *P. minutiflora* Cogn. viel näher als *P. obovata* Ldl. Schon die Form der Blätter ist recht verschieden. Die Sepalen und Petalen besitzen eine ganz andere Gestalt, auch das Labellum ist durchaus schmäler, ganz abgesehen von den Unterschieden in der Säule.

Pleurothallis hirtipes Schltr., nov. spec.

Eriophytes pusilla 10—12 µm aitac. rhizomata decurrentia, rizoida